

**Đáp án chuyên đề:  
Hai đường thẳng vuông góc - Hình học 11**

16.

a) Đặt  $AB = AD = AC = a$

$$\begin{aligned} \text{Ta có } \overrightarrow{CD} \cdot \overrightarrow{AB} &= (\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AB} \\ &= |\overrightarrow{AB}| |\overrightarrow{AD}| \cos 60^\circ - |\overrightarrow{AB}| |\overrightarrow{AC}| \cos 60^\circ \\ &= a \cdot a \cdot \frac{1}{2} - a \cdot a \cdot \frac{1}{2} = 0 \end{aligned}$$

Vậy  $AB \perp CD$ .

b) Ta có  $MN \parallel PQ \parallel AB$  và

$$MN = PQ = \frac{AB}{2} = \frac{a}{2} \text{ nên tứ giác}$$

$MN PQ$  là hình bình hành.

$$\text{Lại có } \begin{cases} MN \parallel AB \\ NP \parallel CD \Rightarrow MN \perp NP, \text{ do} \\ AB \perp CD \end{cases}$$

đó  $MN PQ$  là hình chữ nhật.

17. Đặt  $\overrightarrow{AA'} = \vec{a}, \overrightarrow{AB} = \vec{b}, \overrightarrow{AD} = \vec{c}$ .

a) Ta có  $\overrightarrow{AC'} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}, \overrightarrow{B'D'} = \vec{c} - \vec{b}$  nên



$$\begin{aligned} \overrightarrow{AC'} \cdot \overrightarrow{B'D'} &= (\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}) \cdot (\vec{c} - \vec{b}) \\ &= \vec{a} \cdot (\vec{c} - \vec{b}) + \vec{c}^2 - \vec{b}^2 = a^2 - a^2 = 0 \\ &\Rightarrow AC' \perp B'D'. \end{aligned}$$

$$\text{b) } \overrightarrow{MN} = \overrightarrow{AN} - \overrightarrow{AM} = (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BN}) - (\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DM})$$

$$= \left( \vec{b} + \frac{x}{a} \vec{a} \right) - \left( \vec{c} + \frac{x}{a} \vec{b} \right) = \frac{x}{a} \vec{a} + \left( 1 - \frac{x}{a} \right) \vec{b} - \vec{c}$$

Từ đó ta có

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AC'} \cdot \overrightarrow{MN} &= (\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}) \cdot \left[ \frac{x}{a} \vec{a} + \left( 1 - \frac{x}{a} \right) \vec{b} - \vec{c} \right] \\ &= \frac{x}{a} \vec{a}^2 + \left( 1 - \frac{x}{a} \right) \vec{b}^2 - \vec{c}^2 = x \cdot a + \left( 1 - \frac{x}{a} \right) a^2 - a^2 = 0. \end{aligned}$$



Vậy  $AC' \perp MN$ .

18. Gọi  $M, N, P$  lần lượt là trung điểm của  $SA, SB, AC$ , khi đó  $MN \parallel AB$  nên  $(AB, SC) = (MN, SC)$ .

Đặt  $\varphi = \angle NMP$ , trong tam giác  $MNP$  có

$$\cos \varphi = \frac{MN^2 + MP^2 - NP^2}{2MN \cdot MP} \quad (1).$$

Ta có  $MN = MP = \frac{a}{2}$ ,

$AB^2 + AC^2 = BC^2 \Rightarrow \triangle ABC$  vuông tại

$A$ , vì vậy  $PB^2 = AP^2 + AC^2 = \frac{5a^2}{4}$ ,

$PS^2 = \frac{3a^2}{4}$ . Trong tam giác  $PBS$  theo công thức tính đường trung tuyến ta có


$$PN^2 = \frac{PB^2 + PS^2}{2} - \frac{SB^2}{4} = \frac{\frac{5a^2}{4} + \frac{3a^2}{4}}{2} - \frac{a^2}{4} = \frac{3a^2}{4}.$$

Thay  $MN, MP, NP$  vào (1) ta được  $\cos \varphi = -\frac{1}{2} \Rightarrow \varphi = 120^\circ$ .

Vậy  $(AB, SC) = (MN, SC) = 60^\circ$ .

19. a)  $(BC, SD) = 45^\circ$       b)  $(IJ, AC) = 90^\circ$ .

20.



a) Gọi P là trung điểm của BC, thì các tam giác

$$ABC \text{ và } DBC \text{ cân nên } \begin{cases} AP \perp BC \\ DP \perp BC \end{cases}$$


Ta có  $\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC} \cdot (\overrightarrow{PD} - \overrightarrow{PA}) = 0$

Vậy  $BC \perp AD$ .

b) Ta có  $\overrightarrow{MA} = k\overrightarrow{MB} \Rightarrow \frac{MA}{MB} = |k|$ ,

$$\overrightarrow{ND} = k\overrightarrow{NB} \Rightarrow \frac{ND}{NB} = |k| \Rightarrow \frac{MA}{MB} = \frac{ND}{NB}$$

suy ra



$$MN \parallel AD \Rightarrow (MN, BC) = (AD, BC) = 90^\circ \text{ (Theo câu a)}$$

21. HS tự giải.

22. Gọi O là trung điểm của AC, ta có  $OM = ON = a$ .


$$\begin{cases} OM \parallel AB \\ ON \parallel CD \end{cases} \Rightarrow (AB, CD) = (OM, ON)$$

Áp dụng định lí côsin cho tam giác OMN ta có

$$\cos \angle MON = \frac{OM^2 + ON^2 - MN^2}{2OM \cdot ON}$$

$$= \frac{a^2 + a^2 - (a\sqrt{3})^2}{2 \cdot a \cdot a} = -\frac{1}{2}$$

Vậy  $(AB, CD) = 60^\circ$ .



23. a) Ta có  $MC = MD = \frac{a\sqrt{3}}{2}$  nên tam giác

$MCD$  cân tại  $M$ , do đó  $MN \perp CD$ .

Lại có  $RP \parallel CD \Rightarrow MN \perp RQ$ .

b) Tương tự ta có  $QP \perp AD$


Trong tam giác vuông  $PDQ$  ta có

$$QP^2 = QD^2 - DP^2 = \left(\frac{a\sqrt{3}}{2}\right)^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2 = \frac{a^2}{2} \text{ Ta có :}$$

$$RQ^2 + RP^2 = \left(\frac{a}{2}\right)^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2 = a^2 = QP^2$$

Do đó tam giác  $RPQ$  vuông tại  $R$ , hay  $RP \perp RQ$ .

$$\text{Vì vậy } \begin{cases} AB \parallel RQ \\ CD \parallel RP \Rightarrow AB \perp CD. \\ RP \perp RQ \end{cases}$$



24. Gọi  $M, N, P$  lần lượt là trung điểm của các cạnh  $AB, CD, AD$ .

a) Do hai tam giác  $ACD$  và  $BCD$  có  $CD$  chung và  $AC = BD, AD = BC$  nên chúng bằng nhau, suy ra  $MC = MD$

Vậy tam giác  $MCD$  cân tại  $M$  và có trung tuyến  $MN$  nên  $MN \perp CD$ . Tương tự  $MN \perp AB$ .


Chứng minh tương tự cho hai cặp cạnh đối còn lại.

b) Ta có

$$\begin{cases} PM \parallel BD \\ PN \parallel AC \end{cases} \Rightarrow (BD, AC) = (PM, PN)$$

Theo công thức tính đường trung tuyến ta có

$$CM^2 = \frac{CA^2 + CB^2}{2} - \frac{AB^2}{4} = \frac{2(b^2 + c^2) - a^2}{4}$$



Tương tự  $DM^2 = \frac{2(b^2 + c^2) - a^2}{4}$ , nên

$$MN^2 = \frac{MC^2 + MD^2}{2} - \frac{CD^2}{4} = \frac{2(b^2 + c^2) - a^2}{4} - \frac{a^2}{4} = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2}$$

Áp dụng định lí cô sin cho tam giác PMN ta có

$$\cos MPN = \frac{PM^2 + PN^2 - MN^2}{2 \cdot PM \cdot PN} = \frac{\left(\frac{b}{2}\right)^2 + \left(\frac{b}{2}\right)^2 - \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2}}{2 \left(\frac{b}{2}\right) \left(\frac{b}{2}\right)} = \frac{2(a^2 - c^2)}{b^2}$$

$$\text{Vậy } (\overline{AC}, \overline{BD}) = \arccos \left| \frac{2(a^2 - c^2)}{b^2} \right|.$$

25. a) Ta có 
$$\begin{cases} (\alpha) \parallel (SAB) \\ (SAB) \cap (ABCD) = AB \Rightarrow MN \parallel AB. \\ (\alpha) \cap (ABCD) = MN \end{cases}$$

Tương tự 
$$\begin{cases} (\alpha) \parallel (SAB) \\ (SBC) \cap (SAB) = SB \Rightarrow NP \parallel SB \\ (\alpha) \cap (SBC) = NP \end{cases}$$

$$\begin{cases} (\alpha) \parallel (SAB) \\ (SAD) \cap (SAB) = SA \Rightarrow MQ \parallel SA \\ (\alpha) \cap (SAD) = MQ \end{cases}$$

Dễ thấy  $MN \parallel PQ \parallel AB \parallel CD$  nên MNPQ là hình bình hành

Lại có  $\begin{cases} MN \parallel AB \\ MQ \parallel SA \Rightarrow MN \perp MQ. \\ AB \perp SA \end{cases}$

Vậy MNPQ là hình thang vuông.

b) Ta có  $MN = AB = a$ ,  $MQ = \frac{SA}{2} = \frac{a}{2}$ ,

$$PQ = \frac{CD}{2} = \frac{a}{2}.$$

Vậy  $S_{MNPQ} = \frac{1}{2}(MN + PQ) \cdot MQ$

$$= \frac{1}{2} \left( a + \frac{a}{2} \right) \frac{a}{2} = \frac{3a^2}{8}.$$

