

**Đáp án chuyên đề:  
Đại cương về mặt phẳng và đường thẳng - Hình học 11**

1. a) Ta có M,N lần lượt là điểm chung của hai mặt phẳng (MBC) và (NAD) nên  $(MBC) \cap (NAD) = MN$ .

b)

$$\text{Gọi } I = BM \cap DE \Rightarrow \begin{cases} I \in BM \subset (BCM) \\ I \in DE \subset (DEF) \end{cases}$$

$$\Rightarrow I \in (BCM) \cap (DEF).$$

Tương tự, gọi  $J = CM \cap DF$  thì


$$\Rightarrow J \in (BCM) \cap (DEF).$$

Do đó  $IJ = (BCM) \cap (DEF)$ .

2.

a) Ta có  $(SAB) \cap (SCD) = SE$ ,  
 $(SAC) \cap (SBD) = SF$ .

b) Gọi I, J lần lượt là giao điểm của EF với BC, AD thì  
 $(SEF) \cap (SAD) = SJ$ ,  $(SEF) \cap (SBC) = SI$ .



3.

a) Gọi E, F lần lượt là giao điểm của AM, AN với BD và CD thì  $EF = (AMN) \cap (BCD)$ .

b) Gọi I, K lần lượt là giao điểm của DN, DM với AC và AB thì  
 $EF = (DMN) \cap (ABC)$ .


4.


a) Trong (BCD) gọi  $E = CD \cap NP$  thì

$$\begin{cases} E \in CD \\ E \in NP \subset (MNP) \end{cases}$$

$$\Rightarrow E = CD \cap (MNP).$$

b) Trong (ACD) gọi  $Q = AD \cap ME$  thì ta có  $(MNP) \cap (ABD) = PQ$






5.

a) Trong  $(ABCD)$  gọi  $O = AC \cap BD$ , trong  $(SAC)$  gọi  $I = AM \cap SO$

$$\Rightarrow \begin{cases} I \in AM \\ I \in SO \subset (SBD) \end{cases} \Rightarrow I = AM \cap (SBD).$$

b) Trong  $(ABCD)$  gọi  $J = AN \cap BD$ , kéo dài  $IJ$  cắt  $SD$  tại  $K$ .

$$\text{Ta có } \begin{cases} K \in SD \\ K \in IJ \subset (AMN) \end{cases} \Rightarrow K = SD \cap (AMN).$$



6. a) Gọi  $E = AB \cap (\alpha)$  thì  $E$  cố định và


$$\begin{cases} E \in AB \subset (\beta) \\ E \in (\alpha) \end{cases} \Rightarrow E \in \Delta = (\alpha) \cap (\beta) \quad (1)$$

Tương tự

$$\begin{cases} M = d_1 \cap (\beta) \\ d_1 \subset (\alpha) \end{cases}$$

$$\Rightarrow M \in \Delta = (\alpha) \cap (\beta) \quad (2).$$

$$\begin{cases} N = d_1 \cap (\beta) \\ d_1 \subset (\alpha) \end{cases}$$



$\Rightarrow N \in \Delta = (\alpha) \cap (\beta)$  (3). Từ (1),(2),(3) suy ra M,N,E thẳng hàng hay MN đi qua điểm E cố định.

b) Ta có  $I = AM \cap BN \Rightarrow \begin{cases} I \in AM \subset mp(A, d_1) \\ I \in BN \subset mp(B, d_2) \end{cases} \Rightarrow I \in \Delta' = mp(A, d_1) \cap mp(B, d_2)$

rõ ràng  $mp(A, d_1), mp(B, d_2)$  là các mặt phẳng cố định nên  $\Delta'$  cố định.

Vậy I luôn thuộc đường thẳng cố định  $\Delta'$ .

c) Lập luận tương tự câu b) ta có  $J \in \Delta'' = mp(A, d_2) \cap mp(B, d_1)$ .

d) Gọi  $(\delta)$  là mặt phẳng xác định bởi  $\Delta', \Delta''$  thì  $(\delta)$  cố định

Gọi  $F = AB \cap (\delta)$ . Gọi  $K = AB \cap (\delta) \Rightarrow K$  cố định

Dễ thấy I, J là điểm chung của các mặt phẳng  $(A, d_1), (B, d_2)$  và  $(A, d_2), (B, d_1)$  nên I, J thuộc  $mp(\Delta', \Delta'')$ . Vậy I, J, K thẳng hàng do đó IJ đi qua điểm K cố định.

7. a) Trong  $(BCD)$  gọi  $E = JK \cap CD \Rightarrow \begin{cases} E \in CD \\ E \in (IJK) \end{cases}$

$\Rightarrow E = CD \cap (IJK)$ .

Áp dụng định lý Menelaus cho tam giác

BCD đối với cát tuyến EKJ ta có

$$\frac{KD}{KB} \cdot \frac{JB}{JC} \cdot \frac{EC}{ED} = 1 \text{ mà } \frac{KD}{KB} = \frac{1}{2}, \frac{JB}{JC} = 1, \text{ do đó}$$

$$\frac{EC}{ED} = 2. \text{ Hay } DE = DC.$$

b) Trong  $(ACD)$  gọi

$$F = AD \cap IE \Rightarrow \begin{cases} F \in AD \\ F \in IE \subset (IJK) \end{cases}$$

$$F = AD \cap (IJK).$$


Áp dụng định lý Menelaus cho tam giác

ACD đối với cát tuyến EFI ta có

$$\frac{EC}{ED} \cdot \frac{FD}{FA} \cdot \frac{IA}{IC} = 1, \text{ mà } \frac{EC}{ED} = 2 \text{ (câu a)}$$

$$\frac{IA}{IC} = 1 \text{ suy ra } \frac{FD}{FA} = \frac{1}{2} \Rightarrow FA = 2FD.$$

c) Do  $\frac{FD}{FA} = \frac{1}{2}, \frac{KD}{KB} = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{FD}{FA} = \frac{KD}{KB} \Rightarrow FK \parallel AB$



8. a) Gọi  $O = AC \cap BD$ , trong  $(SAC)$  gọi


$$E = AM \cap SO \Rightarrow \begin{cases} E \in AM \\ E \in SO \subset (SBD) \end{cases}$$

$$\Rightarrow E = AM \cap (SBD).$$

Do  $O, M$  lần lượt là trung điểm của  $AC$  và  $SC$  nên  $E$  là trọng tâm của tam giác  $SAC$  do đó

$$\frac{EM}{EA} = \frac{1}{2}.$$

b) Trong  $(SBD)$  gọi



$$F = BE \cap SD \Rightarrow \begin{cases} F \in SD \\ F \in BE \subset (ABM) \end{cases} \Rightarrow F = SD \cap (ABM).$$

Vì  $SO$  là trung tuyến của tam giác  $SBD$  và  $\frac{SE}{SO} = \frac{2}{3}$  (do  $E$  là trọng tâm của tam giác  $SAC$ ) nên  $E$  là trọng tâm của tam giác  $SBD$ , do đó  $F$  là trung điểm của  $SD$ .

9. a) Gọi  $E$  là trung điểm của  $AD$  và  $I = MG \cap BE \Rightarrow \begin{cases} I \in MG \\ I \in BE \subset (ABCD) \end{cases}$

$$\Rightarrow I = GM \cap (ABCD).$$

Gọi  $N$  là trung điểm của  $BE$  thì  $MN \parallel \frac{1}{2}SE$ .

Ta có  $\frac{IG}{IM} = \frac{GE}{MN} = \frac{\frac{1}{3}SE}{\frac{1}{2}SE} = \frac{2}{3}$ , mà  $IM$  là trung tuyến của  $\Delta SBI$  nên  $G$  là trọng tâm

của  $\Delta SBI \Rightarrow E$  là trung điểm của  $BI$ , do đó  $ABDI$  là hình bình hành  $DI \parallel AB$ , mặt khác  $CD \parallel AB$ . Vậy  $I, C, D$  thẳng hàng, hay  $I \in CD$  và  $IC = 2ID$ .

b)


Trong  $(ABCD)$  gọi  $J = AD \cap OI$  thì  $J$  chính là giao điểm của  $AD$  với  $(OMG)$ .  
 Dễ thấy rằng  $J$  là trọng tâm của tam giác  $IAC$  nên  $\frac{JA}{JD} = 2$ .

c) Trong  $(SAD)$  gọi  $K = JG \cap SA$  thì  $K$  là giao điểm của  $(OMG)$  với  $SA$

Ta có  $J$  là trọng tâm tam giác  $IBD$  nên

$$\frac{EJ}{ED} = \frac{1}{3} = \frac{EG}{ES} \Rightarrow JG \parallel SD \text{ từ đó ta có}$$

$$\frac{KS}{KA} = \frac{JD}{JA} = \frac{1}{2}$$



10.

a) Ta có  $I = c \cap (\alpha) \Rightarrow \begin{cases} I \in c \subset mp(O, c) \\ I \in (\alpha) \end{cases}$

Lại có

$$O \in (\alpha) \cap mp(O, c) \Rightarrow OI \subset (\alpha) \cap mp(O, c).$$

b) Do  $O = a \cap b \Rightarrow \begin{cases} O \in a \subset mp(M, a) \\ O \in b \subset mp(M, b) \end{cases}$

$$\Rightarrow O \in mp(M, a) \cap mp(M, b).$$

Vậy  $OM = mp(M, a) \cap mp(M, b)$ , rõ ràng

$OM \subset mp(O, c)$  cố định.



11. a) Gọi  $O = AC \cap BD$ , trong  $(SAC)$  gọi  $I = SO \cap AN$ ,

trong  $(SBD)$  gọi  $P = MI \cap SD$  thì  $P = SD \cap (AMN)$ .

b) Thiết diện là tứ giác  $AMNP$ .

12. a) Trong  $(\alpha)$  gọi  $K = IJ \cap MN$

Ta chứng minh  $S, O, K$  thẳng hàng.





$$K = IJ \cap MN$$

$$\text{Thật vậy } \Rightarrow \begin{cases} K \in IJ \subset (SAC) \\ K \in MN \subset (SBD) \end{cases}$$

$$\Rightarrow K \in (SAC) \cap (SBD).$$

$$\text{Mà } SO = (SAC) \cap (SBD) \Rightarrow K \in SO$$

Vậy  $SO, IJ, MN$  đồng qui tại  $K$ .

$$E = AB \cap CD$$

$$\text{b) Ta có } \Rightarrow \begin{cases} E \in AB \subset (SAB) \\ E \in CD \subset (SCD) \end{cases}$$

$$\Rightarrow E \in (SAB) \cap (SCD)$$

Tương tự  $F \in (SAB) \cap (SCD)$ , do

đó  $S, E, F$  là điểm chung của hai mặt phẳng  $(SAB)$  và  $(SCD)$  nên chúng thẳng hàng.

c) Do  $IJ$  không song song với  $AC$  nên trong  $(SAC)$  gọi  $R = IJ \cap AC$  thì  $R$  cố định.

$$\text{Dễ thấy } PQ = (ABCD) \cap (\alpha).$$

$$R = IJ \cap AC \Rightarrow \begin{cases} R \in IJ \\ R \in AC \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} R \in (\alpha) \\ R \in (ABCD) \end{cases} \Rightarrow R \in PQ.$$



Vậy  $PQ$  luôn đi qua điểm  $R$  cố định khi  $(\alpha)$  thay đổi.

13. a) Trong  $(ABC)$  gọi  $E = MN \cap AC$ , trong  $(SAC)$  gọi  $Q = EP \cap SA$ , thiết diện là tứ giác  $MNPQ$ .

b) Vì  $I = MP \cap NQ$

$$\Rightarrow \begin{cases} I \in MP \subset (SMC) \\ I \in NQ \subset (SAN) \end{cases}$$

$$\Rightarrow I \in (SAN) \cap (SMC)$$



Mặt khác gọi  $O = AN \cap CM$  thì  $O$  cố định nên  $SO = (SCM) \cap (SAN)$  cố định.

Vậy  $I$  thuộc đường thẳng  $SO$  cố định.

14. a) Gọi  $O = AC \cap BD$ ,  $I = SO \cap BM$

$$\text{thì } \begin{cases} I \in BM \\ I \in SO \subset (SAC) \end{cases}$$

$$\Rightarrow I = BM \cap (SAC).$$

b) Gọi  $K = AN \cap BD$ ,  $J = SO \cap KM$ ,

$$E = AJ \cap SC.$$

Do  $J \in KM \subset (AMN) \Rightarrow AJ \subset (AMN)$

$$\Rightarrow E \in (AMN)$$

$$\Rightarrow E \in (SBC) \cap (AMN).$$

Từ đó ta có  $NE = (AMN) \cap (SBC)$ .

Gọi  $d = (SAD) \cap (SBC)$  thì  $d$  cố định.

Trong  $(SAD)$  gọi  $F = AM \cap d$  thì  $F$

cố định.

Do  $F \in d \subset (SBC) \Rightarrow F \in (SBC)$ .

Vậy  $N, E, F$  là điểm chung của hai mặt phẳng  $(AMN)$  và  $(SBC)$  nên chúng thẳng hàng, hay  $NE$  đi qua điểm  $F$  cố định.

c) Gọi  $Y$  là trung điểm của  $AB$  và  $X = DY \cap MG$ . Trong  $(ABCD)$  gọi  $O = NX \cap AB$  và  $Z = NX \cap CD$ , trong  $(SCD)$  gọi  $T = MZ \cap SC$



trong  $(SAB)$  gọi  $P = QG \cap SA$ . Thiết diện là ngũ giác  $MPQNT$ .

15.

a) Trong  $(SAC)$  gọi  $I = SO \cap A'C'$ , vì  $I \in SO \subset BD \Rightarrow I \in (SBD)$ .

Trong  $(SBD)$  gọi  $D' = B'I \cap SD$

$$\Rightarrow \begin{cases} D' \in SD \\ D' \in B'I \subset (\alpha) \end{cases} \Rightarrow D' = SD \cap (\alpha).$$



b) Kẻ  $AK \parallel A'C', K \in SO$  và  $CJ \parallel A'C', J \in SO$ .

Ta có  $\frac{SA}{SA'} = \frac{SK}{SI}$ .

Và  $\frac{SC}{SC'} = \frac{SJ}{SI} \Rightarrow \frac{SA}{SA'} + \frac{SC}{SC'} = \frac{SO}{SI} + \frac{SK}{SI}$   
 $= \frac{SO + SJ}{SI} = \frac{(SO - OK) + (SO + OJ)}{SI} = \frac{2SO}{SI}$  (1)

(do  $AK \parallel CJ \Rightarrow \frac{OK}{OJ} = \frac{OA}{OC} = 1 \Rightarrow OK = OJ$ )

Tương tự ta cũng tính được  $\frac{SB}{SB'} + \frac{SD}{SD'} = \frac{2SO}{SI}$  (2)

Từ (1),(2) suy ra:  $\frac{SA}{SA'} + \frac{SC}{SC'} = \frac{SB}{SB'} + \frac{SD}{SD'}$

(đpcm)

16. a) Trong  $(ABCD)$  gọi  $E = AC \cap BI$

$\Rightarrow E \in BI \subset (SBI)$ . Trong  $(SBI)$  gọi

$$K = IJ \cap SE \Rightarrow \begin{cases} K \in IJ \\ K \in SE \subset (SAC) \end{cases}$$

$\Rightarrow K = IJ \cap (SAC)$ .

Trong  $(ABCD)$  gọi  $F = AC \cap BD$

$\Rightarrow F \in BD \subset (SBD)$ .

Trong  $(SBD)$  gọi

$$L = SF \cap DJ \Rightarrow \begin{cases} L \in DJ \\ L \in SF \subset (SAC) \end{cases}$$

$\Rightarrow L = DJ \cap (SAC)$ .

b) Dễ thấy  $A, K, L, M \in (SAC)$  (1).

Mặt khác

$K \in IJ \subset (AOJ)$ ,

$L \in DJ \subset (AOJ)$ ,  $M \in OJ \subset (AOJ)$



nên  $A, K, L, M \in (AOJ)$  (2).

Từ (1),(2) suy ra  $A, K, L, M$  cùng

thuộc hai mặt phẳng  $(SAC)$  và  $(AOJ)$

nên chúng thuộc giao tuyến của hai mặt phẳng  $(SAC)$  và  $(AOJ)$ , hay


$A, K, L, M$  thẳng hàng.



17. Gọi  $O = AC \cap BD$ ,  $K = IJ \cap SO$  thì  $SO, MN, IJ$  đồng quy tại  $K$



Gọi



$$H = MI \cap NJ \Rightarrow \begin{cases} H \in MI \subset (SAB) \\ H \in (SBC) \end{cases} \Rightarrow H \in (SAB) \cap (SBC).$$

Gọi  $E = AD \cap BC \Rightarrow SE = (SAD) \cap (SBC)$ . Vậy  $H \in SE$ .

Gợi hạn

Gọi  $M_0 = BK \cap SD$  và  $N_0 = DK \cap SB$

Khi  $M \rightarrow M_0$  thì  $N \rightarrow B$

Khi  $N \rightarrow N_0$  thì  $M \rightarrow D$

Vậy để  $(\alpha)$  cắt các cạnh  $SB, SD$  thì  $M$  thuộc đoạn  $DM_0$  và  $N$  thuộc đoạn  $BN_0$ .

Gọi  $H_1 = IM_0 \cap SE$  thì quỹ tích điểm  $H$  là tia  $H_1x$  chứa  $E$ .

(Bạn đọc tự làm phần đảo).

**18.** Gọi  $I$  là tâm đường tròn nội tiếp tam giác  $BCD$  và  $E = AI \cap CD$ .

Theo tính chất đường phân giác ta có

$\frac{ED}{EC} = \frac{BD}{BC}$  (1). Mặt khác từ giả thiết

$$AB \cdot CD = AC \cdot BD \Rightarrow \frac{BD}{BC} = \frac{AD}{AC} \quad (2)$$

Từ (1) và (2) suy ra  $\frac{EC}{ED} = \frac{AD}{AC} \Rightarrow AE$  là

đường phân giác của góc  $A$  trong tam giác  $ACD$ . Nghĩa là tâm  $J$  của đường tròn nội tiếp tam giác  $ACD$  thuộc  $AE$ .

Do  $AI$  và  $BJ$  cùng thuộc  $(ABE)$  nên

chúng cắt nhau tại  $O$ . Vậy bốn đường thẳng nối các đỉnh với tâm đường tròn nội tiếp các mặt đối diện đôi một cắt nhau và chúng không đồng phẳng nên phải đồng quy.

