

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ

SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH
TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM HỌC 2016 -2017
MÔN THI: TOÁN

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

ĐỀ CHÍNH THỨC

Mã đề thi 113

Họ, tên thí sinh:..... SBD:

Câu 1: Tập xác định của hàm số: $y = \sqrt{\log_{\frac{1}{2}} \frac{2-x}{x+2}}$ là:

- A. $[0;2)$ B. $(0;2)$ C. $(-2;2)$ D. $(-\infty;-2) \cup [0;2)$

Câu 2: Nếu $\lg 3 = a$ thì $\lg 9000$ bằng:

- A. $a^2 + 3$ B. $3 + 2a$ C. $3a^2$ D. a^2

Câu 3: Giá trị cực tiểu của hàm số $y = x^3 - 3x^2 - 9x + 2$ là:

- A. 7 B. -30 C. -25 D. -24

Câu 4: Tập xác định của hàm số $y = x^3 - 3x^2$ là:

- A. $(-\infty;3)$ B. \mathbb{R} C. $(3;+\infty)$ D. $\mathbb{R} \setminus \{0\}$

Câu 5: Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = x^3 - 3x + 2$ trên đoạn $[-1;2]$ là:

- A. 0 B. 2 C. 4 D. -2

Câu 6: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, cạnh huyền $AC = \sqrt{2}$, cạnh bên SA vuông góc với (ABC), $SA = 2$. Thể tích khối chóp S.ABC bằng:

- A. $\frac{2}{3}$ (đvtt) B. 1 (đvtt) C. $\frac{2}{3}$ (đvtt) D. $\frac{1}{3}$ (đvtt)

Câu 7: Số giao điểm của đồ thị hàm số $y = x^3 - x^2 + x + 1$ với đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{2x-1}{x+1}$ là:

A. 2

B. 0

C. 3

D. 1

Câu 8: Cho hàm số $y = \frac{x+1}{x-1}$. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

A. Hàm số nghịch biến trên các khoảng $(-\infty; 1)$ và $(1; +\infty)$.

B. Hàm số nghịch biến trên \mathbb{R} .

C. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; 1)$ và nghịch biến trên khoảng $(1; +\infty)$.

D. Hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.

Câu 9: Tập hợp các giá trị a để phương trình: $x^4 - 4x^2 + |\log_3 a| + 3 = 0$ có 4 nghiệm thực phân biệt là:

A. $\left[\frac{1}{27}; 3\right)$

B. $(0; 3)$

C. $[1; 3)$

D. $\left(\frac{1}{3}; 3\right)$

Câu 10: Trong không gian Oxyz cho tam giác ABC có $A(1; -5; 4), B(3; -1; 7), C(2; 0; 1)$, trong các điểm sau đây, điểm nào là trọng tâm tam giác ABC?

A. $G(2; -2; 4)$

B. $G(-2; 2; 4)$

C. $G(2; -4; 2)$

D. $G(2; 4; -2)$

Câu 11: Số đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{\sqrt{x^2+1}}{x^2-1}$ là:

A. 2

B. 1

C. 0

D. 3

Câu 12: Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật; cạnh $AB = a$, $AD = 2a$, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy, góc giữa cạnh SD và mặt phẳng đáy bằng 60° . Thể tích V của khối chóp S.ABCD là:

A. $V = 4\sqrt{3}a^3$ (đvtt) B. $V = \frac{a^3}{3}$ (đvtt) C. $V = \frac{4\sqrt{3}}{3}a^3$ (đvtt) D. $V = \frac{2\sqrt{3}a^3}{3}$ (đvtt)

Câu 13: Trong không gian Oxyz, cho các vector $\vec{a}(1; 2; 3)$, $\vec{b}(-2; 3; -1)$. Toạ độ của Vector $\vec{a} + 2\vec{b}$ là:

A. $(-3; 8; 1)$

B. $(-3; 8; 3)$

C. $(-3; 6; 1)$

D. $(-4; 8; 1)$

Câu 14: Phương trình đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{x+2}{x-2}$ là:

- A. $y=1$ B. $x=-2$ C. $x=2$ D. $y=-1$

Câu 15: Cho tứ diện OABC có OA, OB, OC đôi một vuông góc nhau và $OA = a$, $OB = 2a$, $OC = 3a$. Diện tích của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp O.ABC bằng:

- A. $14\pi a^2$ B. $56\pi a^2$ C. $28\pi a^2$ D. πa^2

Câu 16: Cắt một khối trụ bởi một mặt phẳng qua trục ta được thiết diện là hình chữ nhật ABCD có AB và CD thuộc hai đáy của khối trụ. Biết $AB = 4a$, $AC = 5a$. Thể tích của khối trụ là:

- A. $60\pi a^3$ B. $48\pi a^3$ C. $12\pi a^3$ D. $36\pi a^3$

Câu 17: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm $A(2; -3; -1)$ $B(4; -1; 3)$. Phương trình mặt cầu đường kính AB là:

- A. $(x+3)^2 + (y-2)^2 + (z+1)^2 = 6$ B. $(x-3)^2 + (y+2)^2 + (z-1)^2 = 6$
C. $(x-2)^2 + (y+3)^2 + (z+1)^2 = 6$ D. $(x-3)^2 + (y+2)^2 + (z-1)^2 = \sqrt{6}$

Câu 18: Tập nghiệm của bất phương trình $\log_2(x^2 - 3x + 3) \geq 0$ là:

- A. $[1; 2]$ B. $[2; +\infty)$ C. $(-\infty; 1]$ D. $(-\infty; 1] \cup [2; +\infty)$

Câu 19: Tập nghiệm của bất phương trình $3^{x+2} \geq \frac{1}{9}$ là:

- A. $(-\infty; -4]$ B. $[-4; +\infty)$ C. $(-4; +\infty)$ D. $(-\infty; -4)$

Câu 20: Cho số thực thỏa mãn $\alpha = \log_a x$; $\beta = \log_b x$. Khi đó $\log_{ab^2} x^2$ được tính theo α, β bằng:

- A. $\frac{2}{2\alpha + \beta}$ B. $\frac{2\alpha\beta}{2\alpha + \beta}$ C. $\frac{2(\alpha + \beta)}{\alpha + 2\beta}$ D. $\frac{\alpha\beta}{2\alpha + \beta}$

Câu 21: Họ nguyên hàm của hàm số $y = \sin x$ là:

- A. $-\cos x + C$ B. $\tan x + C$ C. $\cos x + C$ D. $\cot x + C$

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ

Câu 22: Cho khối nón tròn xoay có chiều cao bằng 6cm và bán kính đường tròn đáy bằng 8cm. Thể tích của khối nón là:

- A. 96π (cm³) B. 48π (cm³) C. 128π (cm³) D. 384π (cm³)

Câu 23: Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^{2x}$ là:

- A. $2e^{2x} + C$ B. $\frac{1}{2}e^{2x} + C$ C. $\frac{1}{2}e^x + C$ D. $e^{2x} + C$

Câu 24: Hàm số $y = \sqrt{4-x^2}$ đồng biến trên tập nào trong những tập sau?

- A. (0;2) B. $[-2;2] \setminus \{0\}$ C. (-2;2) D. (-2;0)

Câu 25: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hình bình hành ABCD biết A(1;0;-4), B(2;1;3),

C(-3;4;2) tọa độ điểm D bằng:

- A. D(5;-2;9) B. D(-4;3;-5) C. D(-2;5;9) D. D(-5;3;-4)

Câu 26: Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $\int_0^4 f(x)dx = 4$, $\int_2^3 f(x)dx = 2$. Khi đó giá trị của tổng

$\int_0^2 f(x)dx + \int_3^4 f(x)dx$ bằng:

- A. 4 B. 6 C. -2 D. 2

Câu 27: Họ nguyên hàm của hàm số $y = x^2 + 1$ là

- A. $\frac{x^3}{3} + C$ B. $\frac{x^3}{3} + x + C$ C. $\frac{x^2}{2} + x + C$ D. $2x + C$

Câu 28: Đạo hàm của hàm số $y = \log_3(x^2 - 1)$ là

- A. $y' = \frac{2x}{(x^2 - 1)}$ B. $y' = \frac{2x \ln 3}{(x^2 - 1)}$ C. $y' = \frac{2x}{(x^2 - 1) \ln 3}$ D.
 $y' = \frac{1}{(x^2 - 1) \ln 3}$

Câu 29: Cho hàm số $y = \ln \frac{1}{1+x}$, với $\forall x > -1$, kết luận nào sau đây là đúng?

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ

A. $y' + e^y = 0$ B. $yy' - 2 = 0$ C. $y' - 2y = 1$ D. $y' - 4e^y = 0$

Câu 30: Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' có cạnh $AB = a$; $BC = 2a$; $A'C = \sqrt{2}1a$. Thể tích của khối hộp chữ nhật đó là:

A. $V = \frac{8}{3}a^3$ (đvtt) B. $V = 16a^3$ (đvtt) C. $V = 8a^3$ (đvtt) D. $V = 4a^3$ (đvtt)

Câu 31: Hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}(m^2 + 1)x^2 + (3m - 2)x + m$ đạt cực đại tại $x = 1$ khi:

A. $m = -1$ B. $m = 1$ C. $m = -2$ D. $m = 2$

Câu 32: Tập hợp các giá trị của m để phương trình $\log_{0,5}(m + 6x) + \log_2(3 - 2x - x^2) = 0$ có nghiệm duy nhất là:

A. $(-6; 19)$ B. $(-6; 18)$ C. $(-3; 18)$ D. $(-6; 19]$

Câu 33: Hàm số $y = \frac{mx - 1}{x + m}$ có giá trị lớn nhất trên $[0; 1]$ bằng 2 khi:

A. $m = \frac{1}{2}$ B. $m = 1$ C. $m = -3$ D. $m = -\frac{1}{2}$

Câu 34: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho $|\vec{a}| = 2, |\vec{b}| = 5$, góc giữa hai vector \vec{a} và \vec{b} bằng 120° . Độ dài của vector $\vec{b} - \vec{a}$ bằng:

A. $\sqrt{19}$ B. $\sqrt{21}$ C. $\sqrt{39}$ D. 3

Câu 35: Trong hệ tọa độ Oxyz, cho $A(2; -1; 3)$; $B(1; 2; -1)$; $C(-4; 7; 5)$. Gọi I là chân đường phân giác trong góc A của tam giác ABC, tọa độ của điểm I là:

A. $(6; -3; -7)$ B. $\left(\frac{11}{3}; \frac{-2}{3}; 1\right)$ C. $(-3; 6; -7)$ D. $\left(\frac{-2}{3}; \frac{11}{3}; 1\right)$

Câu 36: Hàm số: $y = -x^4 + 2mx^2 + 1$ đạt cực tiểu tại $x = 0$ khi:

A. $-1 \leq m < 0$ B. $m > 0$ C. $m \geq 0$ D. $m < -1$

Câu 37: Kết quả của phép tính tích phân $\int_0^1 x\sqrt{x^2 + 1} dx$ được biểu diễn dạng $a\sqrt{2} + b$, khi đó giá trị của tích $a.b$ bằng:

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ

A. $\frac{-2}{9}$. B. $\frac{2}{9}$. C. $\frac{-2}{3}$ D. $\frac{2}{3}$.

Câu 38: Tập hợp các giá trị của tham số m để hàm số $y = -x^3 + 3x^2 + mx - 3$ nghịch biến trên $(2; +\infty)$ là:

A. $(-\infty; -3]$ B. $(-\infty; 0]$ C. $(-\infty; 0)$ D. $(-\infty; -3)$

Câu 39: Giá trị của biểu thức $F = \log_3(2 \cos 1^\circ) \cdot \log_3(2 \cos 2^\circ) \cdot \log_3(2 \cos 3^\circ) \dots \log_3(2 \cos 89^\circ)$ là:

A. e B. 1 C. $\frac{2^{89}}{89!}$ D. 0

Câu 40: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai điểm $A(1; 4; 3)$, $B(-1; 3; 5)$, $C(1; 5; 2)$, Số đo góc \widehat{BAC} của tam giác ABC bằng :

A. 60° B. 45° C. 135° D. 45°

Câu 41: Một vật xuất phát từ A chuyển động thẳng và nhanh dần đều với vận tốc $v(t) = 1 + 2t$ (m/s). Tính vận tốc tại thời điểm mà vật đó cách A 20m. (Giả thiết thời điểm vật xuất phát từ A tương ứng với $t = 0$)

A. 11m/s B. 10m/s C. 9m/s D. 12m/s

Câu 42: Kết quả của phép tính tích phân $\int_0^1 \ln(2x+1) dx$ được biểu diễn dạng $a \cdot \ln 3 + b$, khi đó giá trị của tích ab^3 bằng:

A. 3 B. 1 C. $-\frac{3}{2}$ D. $\frac{3}{2}$

Câu 43: Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình thoi cạnh bằng a , Mặt bên SAB là tam giác vuông cân tại S, và thuộc mặt phẳng vuông góc với đáy. Biết thể tích khối chóp S.ABCD bằng $\frac{a^3\sqrt{3}}{12}$. Khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng (SAB) bằng:

A. $\frac{a\sqrt{3}}{4}$ B. $a\sqrt{3}$ C. $\frac{2a\sqrt{3}}{3}$ D. $\frac{a\sqrt{3}}{2}$

Câu 44: Tập hợp các giá trị của m để phương trình $\log_2^2 x - \log_2 x^2 + 3 = m$ có đúng hai nghiệm $x \in [1; 8]$ là:

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ

A. (3;6]

B. [3;6)

C. (2;3]

D. (2;6)

Câu 45: Một gia đình muốn xây một bể nước dạng hình chữ nhật có chiều dài 2,2m, chiều rộng 1.5m, cao 1m. Bể nước được thiết kế không có nắp đậy, bốn bức tường và đáy đều dày 1dm. Bể nước được xây bằng các viên gạch là khối lập phương cạnh bằng 1dm. Giả sử độ dày của vữa xây không đáng kể thì số lượng viên gạch cần để xây bể bằng:

A. 960 (viên)

B. 2340 (viên)

C. 1220 (viên)

D. 3300 (viên)

Câu 46: Tập các giá trị m để đồ thị hàm số $y = \frac{3x+m}{x-1}$ và đường thẳng $y = 2x+1$ có điểm chung là:

A. $(-\infty; -3]$

B. $(-3; +\infty)$

C. $[-3; +\infty)$

D. $(-\infty; -3)$

Câu 47: Sự tăng trưởng của loại vi khuẩn tuân theo công thức $S = Ae^{rt}$, trong đó A là số lượng vi khuẩn ban đầu, r là tỉ lệ tăng trưởng ($r > 0$), t là thời gian tăng trưởng (tính theo đơn vị là giờ). Biết số vi khuẩn ban đầu là 100 con và sau 5 giờ có 300 con. Thời gian để vi khuẩn tăng gấp đôi số ban đầu gần đúng nhất với kết quả nào trong các kết quả sau:

A. 3 giờ 2 phút

B. 3 giờ 9 phút.

C. 3 giờ 20 phút

D. 3 giờ 40 phút.

Câu 48: Tập hợp các giá trị m để bất phương trình: $m \cdot 9^{\sqrt{2x-x^2}} - 3^{\sqrt{2x-x^2}} + 8m - 1 \leq 0$ có nghiệm là:

A. $\left(\frac{2}{9}; +\infty\right)$

B. $\left(-\infty; \frac{1}{4}\right]$

C. $\left[\frac{2}{9}; \frac{1}{4}\right]$

D. $\left[\frac{1}{4}; +\infty\right)$

Câu 49: Một nhà máy sản xuất sữa bột cho trẻ em cần thiết kế bao bì cho một loại sản phẩm mới. Bao bì cần sản xuất có thể tích là 2dm^3 , làm theo dạng hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông và chiều cao là h . Để tiết kiệm vật liệu nhất thì chiều cao h của bao bì gần bằng giá trị nào nhất trong các giá trị sau:

A. 1,26 (dm)
1,03(dm)

B. 1,59(dm)

C. 1,62(dm)

D.

Câu 50: Một thùng hình trụ đựng đầy nước có đường kính bằng 8dm, chiều cao 1m. Một khối lập phương đặc ABCDA'B'C'D' với cạnh bằng 6dm được đặt lên hình trụ sao cho các đỉnh A, C' và hai tâm đáy của hình trụ thẳng hàng. Thể tích lượng nước còn lại trong hình trụ gần bằng giá trị nào nhất trong các giá trị sau:

A. 502,4 (dm³)

B. 497 (dm³)

C. 286,4 (dm³)

D. 483,6(dm³)

----- HẾT -----

ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 113

made	cautron	dapan	113	26	D
113	1	A	113	27	B
113	2	B	113	28	C
113	3	C	113	29	A
113	4	B	113	30	C
113	5	C	113	31	D
113	6	D	113	32	B
113	7	D	113	33	C
113	8	A	113	34	C
113	9	D	113	35	D
113	10	A	113	36	B
113	11	A	113	37	A
113	12	D	113	38	B
113	13	A	113	39	D
113	14	A	113	40	C
113	15	A	113	41	C
113	16	C	113	42	C
113	17	B	113	43	D
113	18	D	113	44	C
113	19	B	113	45	A
113	20	B	113	46	B
113	21	A	113	47	B
113	22	C	113	48	B
113	23	B	113	49	A
113	24	D	113	50	D
113	25	B			