

# HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ

SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ

MÔN THI: TOÁN

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

ĐỀ CHÍNH THỨC

Mã đề thi 303

Họ, tên thí sinh:..... SBD: .....

**Câu 1:** Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' có cạnh  $AB = a$ ;  $BC = 2a$ ;  $A'C = \sqrt{14}a$ . Thể tích của khối hộp chữ nhật đó là:

- A.  $V = 6a^3$  (đvtt)      B.  $V = 4a^3$  (đvtt)      C.  $V = 2a^3$  (đvtt)      D.  $V = 3a^3$  (đvtt)

**Câu 2:** Tập hợp các giá trị a để phương trình:  $x^4 - 4x^2 + |\log_2 a| + 2 = 0$  có 4 nghiệm thực phân biệt là:

- A.  $(0; 4)$       B.  $[1; 4)$       C.  $\left[\frac{1}{4}; 4\right)$       D.  $\left(\frac{1}{4}; 4\right)$

**Câu 3:** Tập nghiệm của bất phương trình  $3^{x+2} \geq \frac{1}{9}$  là:

- A.  $(-\infty; -4)$       B.  $[-4; +\infty)$       C.  $(-\infty; -4]$       D.  $(-4; +\infty)$

**Câu 4:** Cho số thực thỏa mãn  $\alpha = \log_a x$ ;  $\beta = \log_b x$ . Khi đó  $\log_{a \cdot b} x^2$  được tính theo  $\alpha, \beta$  bằng:

- A.  $\frac{2\alpha\beta}{\alpha + 2\beta}$       B.  $\frac{2(\alpha + \beta)}{2\alpha + \beta}$       C.  $\frac{2}{2\beta + \alpha}$       D.  $\frac{\alpha\beta}{\alpha + 2\beta}$

**Câu 5:** Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật; cạnh  $AB = a$ ,  $AD = 2a$ , cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy, góc giữa cạnh SD và mặt phẳng đáy bằng  $60^\circ$ . Thể tích V của khối chóp S.ABCD là:

- A.  $V = \frac{a^3}{3}$  (đvtt)      B.  $V = \frac{2a^3}{\sqrt{3}}$  (đvtt)      C.  $V = 4\sqrt{3}a^3$  (đvtt)      D.  $V = \frac{4a^3}{\sqrt{3}}$  (đvtt)

**Câu 6:** Số giao điểm của đồ thị hàm số  $y = x^3 - x^2 + x + 1$  với đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  $y = \frac{2x-1}{x+1}$  là:

- A. 0      B. 1      C. 2      D. 3

## HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ

---

**Câu 7:** Cho khối nón tròn xoay có chiều cao bằng 6cm và bán kính đường tròn đáy bằng 4cm. Thể tích của khối nón là:

- A.  $48\pi(\text{cm}^3)$       B.  $32\pi(\text{cm}^3)$       C.  $96\pi(\text{cm}^3)$       D.  $36\pi(\text{cm}^3)$

**Câu 8:** Cho hàm số  $f(x)$  thoả mãn  $\int_0^4 f(x)dx = 4$ ,  $\int_2^3 f(x)dx = 2$ . Khi đó giá trị của tổng  $\int_0^2 f(x)dx + \int_3^4 f(x)dx$  bằng:

- A. -2      B. 6      C. 2      D. 4

**Câu 9:** Phương trình đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  $y = \frac{x+2}{x-2}$  là:

- A.  $x = -2$       B.  $y = -1$       C.  $y = 1$       D.  $x = 2$

**Câu 10:** Tập xác định của hàm số  $y = x^3 - 3x^2$  là:

- A.  $\mathbb{R}$       B.  $(3; +\infty)$       C.  $(-\infty; 3)$       D.  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$

**Câu 11:** Cho tứ diện OABC có OA, OB, OC đôi một vuông góc nhau và  $OA = 2a$ ,  $OB = 3a$ ,  $OC = 4a$ . Diện tích của mặt cầu (S) ngoại tiếp hình chóp O.ABC bằng:

- A.  $58\pi a^2$       B.  $29\pi a^2$       C.  $4\pi a^2$       D.  $116\pi a^2$

**Câu 12:** Trong không gian Oxyz, cho các vector  $\vec{a} = (1; 2; 3)$ ,  $\vec{b} = (-2; 3; -1)$ , Tọa độ của Vector  $\vec{a} + 2\vec{b}$  là:

- A.  $(-3; 6; 1)$       B.  $(-3; 8; 3)$       C.  $(-4; 8; 1)$       D.  $(-3; 8; 1)$

**Câu 13:** Giá trị nhỏ nhất của hàm số  $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$  trên đoạn  $[1; 3]$  là:

- A. 2      B. -2      C. 0      D. -3

**Câu 14:** Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai điểm  $A(3; -4; -1)$   $B(1; 2; 3)$ . Phương trình mặt cầu đường kính AB là:

- A.  $(x-3)^2 + (y+4)^2 + (z+1)^2 = 14$       B.  $(x-2)^2 + (y+1)^2 + (z-1)^2 = 14$   
C.  $(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2 = \sqrt{14}$       D.  $(x-2)^2 + (y+1)^2 + (z-1)^2 = \sqrt{14}$

**Câu 15:** Nếu  $\lg 3 = a$  thì  $\lg 9000$  bằng:

- A.  $3+2a$       B.  $a^2+3$       C.  $3a^2$       D.  $a^2$

**Câu 16:** Đạo hàm của hàm số  $y = \log_5(x^2 - 2)$  là

## HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ

---

A.  $y' = \frac{2x \ln 5}{(x^2 - 2)}$       B.  $y' = \frac{2x}{(x^2 - 2)}$       C.  $y' = \frac{1}{(x^2 - 2) \ln 5}$       D.  $y' = \frac{2x}{(x^2 - 2) \ln 5}$

**Câu 17:** Họ nguyên hàm của hàm số  $y = x^3 + 1$  là

A.  $3x^2 + C$       B.  $\frac{x^3}{3} + x^2 + C$       C.  $\frac{x^4}{4} + x + C$       D.  $\frac{x^4}{4} + C$

**Câu 18:** Họ nguyên hàm của hàm số  $y = \sin x$  là:

A.  $-\cos x + C$       B.  $\tan x + C$       C.  $\cot x + C$       D.  $\cos x + C$

**Câu 19:** Tập xác định của hàm số:  $y = \sqrt{\log_{\frac{1}{2}} \frac{1-x}{x+1}}$  là:

A.  $(-\infty; -1) \cup [0; 1)$       B.  $[0; 1)$       C.  $(-1; 1)$       D.  $(0; 1)$

**Câu 20:** Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, cạnh huyền  $AC = \sqrt{2}$ , cạnh bên SA vuông góc với (ABC),  $SA = 2$ . Thể tích khối chóp S.ABC bằng:

A. 1 (đvtt)      B.  $\frac{2}{3}$  (đvtt)      C.  $\frac{1}{3}$  (đvtt)      D.  $\frac{2}{3}$  (đvtt)

**Câu 21:** Cắt một khối trụ bởi một mặt phẳng qua trục ta được thiết diện là hình chữ nhật ABCD có AB và CD thuộc hai đáy của khối trụ. Biết  $AB = 4a$ ,  $AC = 5a$ . Thể tích của khối trụ là:

A.  $36\pi a^3$       B.  $60\pi a^3$       C.  $48\pi a^3$       D.  $12\pi a^3$

**Câu 22:** Tập nghiệm của bất phương trình  $\log_2(x^2 - 3x + 3) \geq 0$  là:

A.  $(-\infty; 1]$       B.  $[2; +\infty)$       C.  $(-\infty; 1] \cup [2; +\infty)$       D.  $[1; 2]$

**Câu 23:** Số đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  $y = \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x^2 - 4}$  là:

A. 0      B. 3      C. 2      D. 1

**Câu 24:** Giá trị cực đại của hàm số  $y = x^3 - 3x^2 - 9x + 2$  là:

A. 12      B. -1      C. 7      D. -25

**Câu 25:** Trong không gian Oxyz cho tam giác ABC có  $A(2; -4; 5), B(4; 0; 8), C(3; 1; 2)$ , trong các điểm sau đây, điểm nào là trọng tâm tam giác ABC?

A.  $G(-1; 3; 5)$       B.  $G(3; -5; 1)$       C.  $G(5; 3; -1)$       D.  $G(3; -1; 5)$

## HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ

---

**Câu 26:** Cho hàm số  $y = \ln \frac{1}{1+x}$ , với  $\forall x > -1$ , kết luận nào sau đây là đúng?

- A.  $y' + e^y = 0$       B.  $y' - 2y = 1$       C.  $yy' - 2 = 0$       D.  $y' - 4e^y = 0$

**Câu 27:** Họ nguyên hàm của hàm số  $f(x) = e^{3x}$  là:

- A.  $\frac{1}{3}e^x + C$       B.  $3e^{3x} + C$       C.  $e^{2x} + C$       D.  $\frac{1}{3}e^{3x} + C$

**Câu 28:** Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hình bình hành ABCD biết  $A(1; 0; -4)$ ,  $B(2; 1; 3)$ ,

$C(-3; 4; 2)$  tọa độ điểm D bằng:

- A.  $D(-2; 5; 9)$       B.  $D(-4; 3; -5)$       C.  $D(-5; 3; -4)$       D.  $D(5; -2; 9)$

**Câu 29:** Cho hàm số  $y = \frac{x+2}{x-2}$ . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

- A. Hàm số nghịch biến trên  $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ .  
B. Hàm số nghịch biến trên  $\mathbb{R}$ .  
C. Hàm số đồng biến trên khoảng  $(-\infty; 2)$  và nghịch biến trên khoảng  $(2; +\infty)$ .  
D. Hàm số nghịch biến trên các khoảng  $(-\infty; 2)$  và  $(2; +\infty)$ .

**Câu 30:** Hàm số  $y = \sqrt{4-x^2}$  đồng biến trên tập nào trong những tập sau?

- A.  $(0; 2)$       B.  $(-2; 2)$       C.  $(-2; 0)$       D.  $[-2; 2] \setminus \{0\}$

**Câu 31:** Kết quả của phép tính tích phân  $\int_0^1 \ln(2x+1)dx$  được biểu diễn dạng  $a \cdot \ln 3 + b$ , khi đó giá trị của tích  $ab^3$  bằng:

- A.  $\frac{3}{2}$       B.  $-\frac{3}{2}$       C. 1      D. 3

**Câu 32:** Một thùng hình trụ đựng đầy nước có đường kính bằng 8dm, chiều cao 1m. Một khối lập phương đặc ABCDA'B'C'D' với cạnh bằng 6dm được đặt lên hình trụ sao cho các đỉnh A, C' và hai tâm đáy của hình trụ thẳng hàng. Thể tích lượng nước còn lại trong hình trụ gần bằng giá trị nào nhất trong các giá trị sau:

- A.  $483,6dm^3$       B.  $502,4dm^3$       C.  $497dm^3$       D.  $286,4dm^3$

## HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ

**Câu 33:** Một nhà máy sản xuất sữa bột cho trẻ em cần thiết kế bao bì cho một loại sản phẩm mới. Bao bì cần sản xuất có thể tích là  $2\text{dm}^3$ , làm theo dạng hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông và chiều cao là  $h$ . Để tiết kiệm vật liệu nhất thì chiều cao  $h$  của bao bì gần bằng giá trị nào nhất trong các giá trị sau:

- A. 1,03dm                      B. 1,59dm                      C. 1,26dm                      D. 1,62dm

**Câu 34:** Trong hệ tọa độ Oxyz, cho  $A(3;0;4)$ ;  $B(2;3;0)$ ;  $C(-3;8;6)$ . Gọi  $I$  là chân đường phân giác trong góc  $A$  của tam giác  $ABC$ , tọa độ của điểm  $I$  là:

- A.  $(7;-2;-6)$                       B.  $(\frac{1}{3};\frac{14}{3};2)$                       C.  $(\frac{14}{3};\frac{1}{3};2)$                       D.  $(-2;7;-6)$

**Câu 35:** Kết quả của phép tính tích phân  $\int_0^2 x\sqrt{x^2+1}dx$  được biểu diễn dạng  $a.\sqrt{5}+b$ , khi đó giá trị của tích  $a.b$  bằng:

- A.  $-\frac{5}{9}$                       B.  $\frac{5}{9}$                       C.  $-\frac{5}{3}$                       D.  $\frac{5}{3}$

**Câu 36:** Một gia đình muốn xây một bể nước dạng hình chữ nhật có chiều dài 2,7m, chiều rộng 1,5m, cao 1,2m. Bể nước được thiết kế không có nắp đậy, bốn bức tường và đáy đều dày 1dm. Bể nước được xây bằng các viên gạch là khối lập phương cạnh bằng 1dm. Giả sử độ dày của vữa xây không đáng kể thì số lượng viên gạch cần để xây bể bằng:

- A. 4860 viên                      B. 1285 viên                      C. 3575 viên                      D. 1610 viên

**Câu 37:** Tập hợp các giá trị của  $m$  để phương trình  $\log_{0,5}(m+7x)+\log_2(4-3x-x^2)=0$  có nghiệm duy nhất là:

- A.  $(-7;28)$                       B.  $(-7;29)$                       C.  $[-7;28]$                       D.  $(-7;29]$

**Câu 38:** Hàm số  $y = \frac{-1}{3}x^3 + \frac{1}{2}(m^2+1)x^2 - (3m-2)x + m$  đạt cực tiểu tại  $x=1$  khi:

- A.  $m=1$                       B.  $m=2$                       C.  $m=-2$                       D.  $m=-1$

**Câu 39:** Tập hợp các giá trị của  $m$  để phương trình  $\log_2^2 x - \log_2 x^2 + 5 = m$  có đúng hai nghiệm  $x \in [1;8]$  là:

- A.  $(5;8]$                       B.  $(4;8]$                       C.  $(4;5]$                       D.  $[5;8)$

**Câu 40:** Sự tăng trưởng của loại vi khuẩn tuân theo công thức  $S = Ae^{rt}$ , trong đó  $A$  là số lượng vi khuẩn ban đầu,  $r$  là tỉ lệ tăng trưởng ( $r > 0$ ),  $t$  là thời gian tăng trưởng (tính theo đơn vị là giờ). Biết số vi khuẩn ban đầu là 200 con và sau 5 giờ có 700 con. Thời gian để vi khuẩn tăng gấp đôi số ban đầu gần đúng nhất với kết quả nào trong các kết quả sau:

- A. 2 giờ 30 phút.                      B. 2 giờ 5 phút                      C. 2 giờ 45 phút                      D. 2 giờ 9 phút.

## HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ

---

**Câu 41:** Hàm số  $y = \frac{mx-1}{x+m}$  có giá trị lớn nhất trên  $[0;1]$  bằng 3 khi :

- A.  $m = 1$ .                      B.  $m = -\frac{1}{3}$ .                      C.  $m = -2$ .                      D.  $m = \frac{1}{2}$ .

**Câu 42:** Giá trị của biểu thức  $F = \log_3(2 \cos 1^\circ) \cdot \log_3(2 \cos 2^\circ) \cdot \log_3(2 \cos 3^\circ) \dots \log_3(2 \cos 89^\circ)$  là:

- A. 1                      B.  $\frac{2^{89}}{89!}$                       C. e                      D. 0

**Câu 43:** Tập các giá trị  $m$  để đồ thị hàm số  $y = \frac{3x+m}{x-1}$  và đường thẳng  $y = 2x+1$  có điểm chung là:

- A.  $(-\infty; -3)$                       B.  $(-3; +\infty)$                       C.  $[-3; +\infty)$                       D.  $(-\infty; -3]$

**Câu 44:** Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình thoi cạnh bằng a, Mặt bên SAB là tam giác vuông cân tại S, và thuộc mặt phẳng vuông góc với đáy. Biết thể tích khối chóp S.ABCD bằng  $\frac{a^3\sqrt{3}}{12}$ . Khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng (SAB) bằng:

- A.  $\frac{a\sqrt{3}}{2}$                       B.  $a\sqrt{3}$                       C.  $\frac{2a\sqrt{3}}{3}$                       D.  $\frac{a\sqrt{3}}{4}$

**Câu 45:** Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai điểm  $A(1; 4; 3)$ ,  $B(-1; 3; 5)$ ,  $C(1; 5; 2)$ , Số đo góc  $\widehat{BAC}$  của tam giác ABC bằng :

- A.  $135^\circ$                       B.  $45^\circ$                       C.  $60^\circ$                       D.  $45^\circ$

**Câu 46:** Tập hợp các giá trị  $m$  để bất phương trình:  $m \cdot 9^{\sqrt{2x-x^2}} - 3^{\sqrt{2x-x^2}} + 8m - 1 \leq 0$  có nghiệm là:

- A.  $\left(-\infty; \frac{1}{4}\right]$                       B.  $\left(\frac{2}{9}; +\infty\right)$                       C.  $\left[\frac{1}{4}; +\infty\right)$                       D.  $\left[\frac{2}{9}; \frac{1}{4}\right]$

**Câu 47:** Tập hợp các giá trị của tham số  $m$  để hàm số  $y = -x^3 + 3x^2 + mx - 3$  nghịch biến trên  $(2; +\infty)$  là:

- A.  $(-\infty; -3)$                       B.  $(-\infty; -3]$                       C.  $(-\infty; 0)$                       D.  $(-\infty; 0]$

**Câu 48:** Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho  $|\vec{a}| = 3$ ,  $|\vec{b}| = 7$ , góc giữa hai vectơ  $\vec{a}$  và  $\vec{b}$  bằng  $120^\circ$  Độ dài của vectơ  $\vec{b} - \vec{a}$  bằng:

- A. 4                      B.  $\sqrt{40}$                       C.  $\sqrt{79}$                       D.  $\sqrt{37}$

## HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ

---

**Câu 49:** Một vật xuất phát từ A chuyển động thẳng và nhanh dần đều với vận tốc  $v(t) = 1+2t$  (m/s). Tính vận tốc tại thời điểm mà vật đó cách A 20m. (Giả thiết thời điểm vật xuất phát từ A tương ứng với  $t = 0$ )

- A. 12m/s                      B. 11m/s                      C. 10m/s                      D. 9m/s

**Câu 50:** Hàm số:  $y = x^4 - 2mx^2 + 1$  đạt cực đại tại  $x = 0$  khi :

- A.  $-1 \leq m < 0$ .                      B.  $m < -1$ .                      C.  $m > 0$ .                      D.  $m \geq 0$ .

----- HẾT -----

**ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 303:**

made	cautron	dapan	303	26	A
303	1	A			
303	2	D	303	27	D
303	3	B	303	28	B
303	4	A	303	29	D
303	5	D	303	30	C
303	6	B	303	31	B
303	7	B	303	32	A
303	8	C	303	33	C
303	9	C	303	34	B
303	10	A	303	35	A
303	11	B	303	36	B
303	12	D	303	37	A
303	13	B	303	38	B
303	14	B	303	39	C
303	15	A	303	40	D
303	16	D	303	41	C
303	17	C	303	42	D
303	18	A	303	43	B
303	19	B	303	44	A
303	20	C	303	45	A
303	21	D	303	46	A
303	22	C	303	47	D
303	23	C	303	48	C
303	24	C	303	49	D
303	25	D	303	50	C